

## PESCA IN BIELORUSSIA 2005

PESCI	LUOGHI DI ABITAZIONE E DI PESCA	INIZIO DELL'ABBOCCARE	PERIODO MIGLIORE PER PESCARE	Nr. AMO	LENZA, mm	ESCHE E ZIMBELLI			
						inverno	primavera	estate	autunno
LUCCIO	piccole insenature coperte d'erbe, tratti diritti, tratti con basso fondale, depressioni, luoghi inceppati	due settimane dopo deposizione delle uova	mattina, sera, di giorno se nuvoloso	6 - 14	0,30 - 0,60	avannotto, esca artificiale	avannotto, esca artificiale, verme	avannotto, esca artificiale	avannotto, esca artificiale
LUCIOPERCA	depressioni inceppate, vecchi letti di fiumi, tratti diritti con fondi duri e di sabbia	luglio, settembre	all'alba, al tramonto, in crepuscolo	10 - 14	0,40 - 0,60	avannotto, esca artificiale	avannotto, esca artificiale	avannotto, esca artificiale	avannotto, esca artificiale
PERCA	nei ripari di ceppo, canneto, alghe	primo ghiaccio, ultimo ghiaccio, fioritura di ciliegio a grappoli, inizio di fienagione	mattina, sera, di giorno se nuvoloso	4 - 8	0,15 - 0,50	avannotto, esca artificiale, larva	avannotto, esca artificiale, larva, verme stercorario	avannotto, esca artificiale, verme, effimera	avannotto, esca artificiale, larva, verme
BOTTATRICE	depressioni, ceppo, sassi, rive dirupate	temperatura d'acqua sotto 16° C	di notte, durante maltempo	8 - 12	0,40 - 0,50	verme, carne, avannotto	verme, avannotto	verme, avannotto	verme, avannotto

ACERINA	dappertutto, salvo luoghi con troppe alghe dove manca l'ossigeno	con schiarimento di acqua di nevi sciolte	sempre, salvo giornate di sole se tira il vento dal Nord	2,5 - 4	0,10 - 0,20	larva, l'occhio di pesce	larva, verme	larva, verme	larva, verme
ABRAMIDE	tratti con basso fondale che confinano con depressioni, depressioni, golfi profondi, nelle foci di fiumi	maggio, agosto, primo ghiaccio, ultimo ghiaccio	all'alba, al tramonto, nelle notti tiepide	3 - 10	0,15 - 0,30	larva, verme, formaggio fuso, scolitide, lappa	larva, verme stercorario, scolitide	larva, pappe, pasta, verme	larva, pappe, pasta, verme
LASCA	acque calme con macchie, nei ripari di canneto, ceppo, alghe	primo ghiaccio, ultimo ghiaccio, dopo deposizione delle uova	mattina, al tramonto, di giorno se nuvoloso	2,5 - 6	0,10 - 0,30	larva, formaggio fuso, scolitide, lappa	larva, scolitide	larva, scolitide	larva, scolitide, pappe
TINCA	luoghi pieni di alghe con il fondo limoso, nelle cave	fine maggio, inizio estate	dall'alba fino che diventa caldo, al tramonto	4 - 8	0,30 - 0,50	--	larva, verme stercorario, pappe	larva, verme stercorario, pappe, crostacei	larva, verme stercorario, pappe
CARASSIO	stagni, cave, laghi con fondo coperto di erbe, golfi di laghi	fioritura di rosa selvatica	mattina, sera, di giorno con il tempo tiepido nuvoloso	4 - 6	0,15 - 0,30	--	verme, larva, pappe	verme, larva, pappe	--

LEUCISCO IDO	acque profonde limpide con correnti piane, insenature con il fondo limoso, vicino agli alberi allagati	uscita di libellula, fioritura di viburno	mattina, sera, di giorno con il tempo tiepido nuvoloso	6 - 8	0,25 - 0,50	larva, scolitide, verme stercorario	larva, maggiolino, verme stercorario	larva, pappe, verme	larva, scolitide
SCARDOLA	acque calme con canneto e alghe	prima e dopo di deposizione delle uova	mattina, sera, di giorno con il tempo sereno	4 - 6	0,20 - 0,40	--	larvo, verme, pasta, pappe	verme, insetti, pane, pappe, pasta	verme, pane, pappe
ALBURNO	laghi e stagni profonde con correnti piane	dopo schiarimento dell'acqua, prima di deposizione delle uova	mattina, sera, di giorno con il tempo tiepido e sereno	3 - 5	0,15 - 0,20	--	scolitide, pasta, larva	scolitide, larva	scolitide, larva, verme
GHIOZZO	sul fondo, basso fondale di sabbia, vicino alle isole. Cerca di evitare il fondo limoso	con schiarimento di acqua di nevi sciolte	mattina, sera, di giorno con il tempo tiepido nuvoloso	4 - 6	0,15 - 0,20	--	larva, verme stercorario	larva, verme stercorario	--